

#### 4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและมีโรคเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนทางไต

ตัวชี้วัด	4.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและมีโรคเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนทางไต
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีภาวะแทรกซ้อนทางไต หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและมีโรคเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนทางไต
วิธีประมวลผลของจ. กาลสินธุ์	คิดจาก 43 แพ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREAIN( "1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I120","I129") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN ("1","2","3","4")) B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREAIN( "1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAEGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย)ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า ร้อยละ 20
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แพ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
รายการข้อมูล 2	B =จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ