

4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ

| | |
|-----------------------------|--|
| ตัวชี้วัด | 4.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ |
| คำนิยาม | ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ |
| วิธีประมวลผลของจ. ภาพสินธุ์ | คิดจาก 43 แฟ้ม(ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" และมีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I110" ,"I119") และ DIAGNOSIS.DIAGCODE between "I20" and "I25") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1","2","3","4") B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดคนตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" |
| เกณฑ์เป้าหมาย | น้อยกว่าร้อยละ 10 |
| ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง |
| วิธีการจัดเก็บข้อมูล | บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ |
| แหล่งข้อมูล | ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม |
| รายการข้อมูล 1 | A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ |
| รายการข้อมูล 2 | B =จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด |
| สูตรคำนวณตัวชี้วัด | $(A/B) \times 100$ |
| ระยะเวลาประเมินผล | ช่วงปีงบประมาณ |