

### 5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมที่มีภาวะแทรกซ้อน

ตัวชี้วัด	5.1.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมที่มีภาวะแทรกซ้อน
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีภาวะแทรกซ้อน หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต , หลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง, หัวใจขาดเลือด
วิธีประมวลผลของ จ.ภาพสินธุ์	คิดจาก 43 แฟ้ม(ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN( "1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดตายก่อนปีงบประมาณและ CHRONIC.TYPEDISCH = "03" (ยังรักษาอยู่)และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I120", "I129")หรือ หรือหลอดเลือดหัวใจ DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I110", "I119") หรือหลอดเลือดสมอง DIAGNOSIS.DIAGCODE=(I60-I64) หรือหัวใจขาดเลือด DIAGNOSIS.DIAGCODE=(I20-I25) B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN( "1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN I10-I159 ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 40
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อน
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ