

5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

ตัวชี้วัด	5.1.2.1 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีภาวะแทรกซ้อนทางไต หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
วิธีประมวลผลของ จ.ภาพสินธุ์	คิดจาก 43 แฟ้ม(ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3")(มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159"ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (DIAGNOSIS.DIAGCODE IN "I120","I129") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN ("1","2","3","4")) B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง),3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9"(ไม่จำหน่าย)และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) ตัดตายก่อนปีงบประมาณ และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN I10-I159ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่า ร้อยละ 20
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนทางไต
รายการข้อมูล 2	B =จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ