

5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ

ตัวชี้วัด	5.1.2.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมมีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีเบาหวานร่วม และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดหัวใจ หมายถึงผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ
วิธีประมวลผลของ จ.ภาพลินธุ์	คิดจาก 43 แพ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN ("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.TYPEDISCH = "03" (ยังรักษาอยู่) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และมี ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ DIAGNOSIS.DIAGCODE IN ("I110" ,"I119") และ DIAGNOSIS.DIAGCODE between "I20" and "I25") ที่ (DIAGNOSIS.DIAGTYPE IN "1","2","3","4") B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN ("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.TYPEDISCH = "03" (ยังรักษาอยู่) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN I10-I159 ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"
เกณฑ์เป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แพ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ

รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ