

5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมได้รับการตรวจ LDL ประจำปี

ตัวชี้วัด	5.8 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมได้รับการตรวจ LDL ประจำปี
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจ LDL หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจ LDL (low-density lipoprotein) เป็นการวัดปริมาณไขมันชนิดร้ายในเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
วิธีประมวลผลของจ. ภาพสินธุ์	คิดจาก 43 แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN ("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149" และที่ได้รับการตรวจ LDL (LABFU.LABTEST="09") ครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ B. ผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง และอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN ("1","3") (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ และอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE="9" (ไม่จำหน่าย) และ PERSON.NATION="099" (สัญชาติไทย) และ CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "I10" AND "I159" ที่ไม่มีเบาหวานร่วม CHRONIC.CHRONIC BETWEEN "E10" AND "E149"
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกโปรแกรมผ่านระบบ HIS ของหน่วยบริการ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีเบาหวานร่วมได้รับการตรวจ LDL
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเบาหวานร่วมทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ช่วงปีงบประมาณ